

PAUTAS A SEGUIR POR EL PACIENTE ANTES Y DESPUES DE LA CIRUGIA ORAL

ANTES DE LA CIRUGIA

- Durante la semana anterior evitar tomar ningún tipo de medicación anticoagulante o antiagregante sin prescripción médica, por ejemplo: ácido acetilsalicílico (aspirina) y mantener una buena higiene oral

- La noche anterior a la cirugía tomar 10 miligramos de diacepam

- Una hora antes de la intervención tomar nuevamente 10 miligramos de diacepam.

- Tomar también 2 gramos de amoxicilina/clavulánico (en caso de alergia a la penicilina tomar 1 gramo de eritromicina)

DESPUES DE LA CIRUGIA

- Tras la cirugía es aconsejable tomar 600 miligramos de ibuprofeno para disminuir las molestias al desaparecer el efecto de la anestesia

- Seis horas después tomar 1 gramo de amoxicilina/clavulánico (en caso de alergia a la penicilina tomar 500 miligramos de eritromicina) y continuar tomando amoxicilina/clavulánico 1 gramo cada 8 horas (en caso de alergia a la penicilina tomar 500 miligramos de eritromicina cada 8 horas) durante los tres días siguientes

- Mantener una buena higiene oral, cepillándose después de cada comida usando un cepillo suave y con cuidado para no abrir la herida, luego enjuagarse con un colutorio de clorhexidina muy suavemente y sin hacer una fuerza con los carrillos

- Los primeros días debe tomar una dieta blanda, masticando con el otro lado y evitar agentes irritantes tales como el alcohol, el tabaco o las comidas muy calientes

- Al principio es normal que note sabor a sangre e incluso que los enjuagues salgan ligeramente teñidos de sangre, sin embargo si nota una hemorragia notable, o bien dolor o inflamación intensos que no ceden con la medicación, por favor póngase en contacto con nosotros.